


سوالات اورژانس امتحان میان دوره ای دستیاران گروه داخلی - اردیبهشت ۹۸

۱- آقای ۲۵ ساله که با شکایت درد قفسه سینه با انتشار به پشت از روز قبل مراجعه کرده است.

Weight = 50 kg BP=110/70mmHg PR=90 RR=18 T=37°C

معاینه قلب و ریه نرمال است. ECG بیمار به صورت زیر است. همه اقدامات زیر در ادامه درمان وی می تواند انجام شود بجز:



| | |
|-----|---|
| الف | ایبوپروفن ۴۰۰ میلیگرم هر ۸ ساعت |
| ب | پردنیزولون ۵۰ میلیگرم روزانه |
| ج | استرپتوکیناز ۱/۵ میلیون واحد در عرض یک ساعت |
| د | کلشی سین ۰/۵ میلیگرم هر ۱۲ ساعت |

۲- آقای ۶۵ ساله ، با شکایت درد قفسه سینه به اورژانس مراجعه کرده است. در بدو ورود به اورژانس دچار همی پارزی خفیف سمت چپ بدن شده است. در معاینه BP=165/100 mmHg و H.R=88/min داشته است و در معاینه سوفل دیاستولیک II/VI در سمت راست استرنوم شنیده می شود. نوار قلب تغییرات معنی داری نسبت به نوارهای قبلی بیمار نشان نمی دهد. اولین اقدام در این مرحله کدام است؟

| | |
|-----|---|
| الف | مشاروه نورولوژی و انجام Brain CT Scan با کنتراست تزریقی |
| ب | بستری در CCU و تجویز نیترات وریدی و هپارین |
| ج | آنژیوگرافی عروق کرونری اورژانسی |
| د | انجام Chest CT-Scan با کنتراست تزریقی |

۳- آقای ۷۵ ساله با سابقه نارسایی احتقانی قلب تحت درمان با وارفارین 5mg روزانه قرار دارد. در آزمایشات انجام شده $INR=7.5$ دارد. شکایتی از خونریزی گوارشی و هماچوری ندارد. در معاینه شواهدی از خونریزی پوستی و مخاطی ندارد. جهت ادامه درمان با وارفارین چه پیشنهادی دارید؟

| | |
|-----|--|
| الف | ادامه درمان با وارفارین به میزان 2.5mg روزانه |
| ب | قطع وارفارین و شروع با دوز کمتر پس از رسیدن INR به زیر ۳ |
| ج | قطع وارفارین و شروع ویتامین K خوراکی به میزان 2mg |
| د | قطع وارفارین و شروع ویتامین K تزریقی به میزان 10mg |

پاسخنامه:

| سوال | پاسخ صحیح |
|------|-----------|
| ۳۹ | ۳ |
| ۴۰ | ۴ |
| ۴۱ | ۲ |