

Leser – Trelat sign



تعريف:

شروع انفجاری کراتوزهای سبورئیک متعدد ، در یک زمینه التهابی که می تواند علامتی از یک بدخیمی داخلی باشد. مثلا قسمتی از یک سندرم پارائتوپلاستیک باشد.

کراتوز سبورئیک که زگیلهای سبورئیک هم نامیده می شوند توده های پوستی بی ضرری هستند که معمولا به رنگ قهوه ای یا سیاه می باشند. این توده ها معمولا روی تنه ایجاد می شوند ، اما ممکن است سر و گردن و با شیوع کمتر پشت دستها و ساعد ها را مبتلا می سازند. ممکن است منفرد یا گروهی باشند.

ضایعات کراتوز سبورئیک معمولا بدون درد اما گاهی خارش دارند . احتمال دارد خاراندن آنها باعث زخم شدن آنها شود.

ممکن است برآمده یا مسطح باشند. سطحش چسبناک و سفت است. در موارد نادری ممکن است فرد صدها عدد از آنها داشته باشد.

علت:

سیتوکینه های مختلف و بقیه فاکتورهای رشدی که توسط نئوپلاسم ترشح می شوند ، محرک ایجاد این ضایعات هستند و در واقع عارضه نئوپلاستیک تومور می باشد.

همراهی:

اکثر نئوپلاسمهای مرتبط ، گوارشی می باشند.

ادنوکارسینومای گوارشی (معده - کبد - کولورکتال - پانکراس) و بدخیمی های پستان ، ریه و دستگاه ادراری میتوانند علامت لسر ترلات (Leser - Trelat) را بدهند.