

SPIDER ANGIOMA



نام های دیگر:

NEVUS ARANEUS

VASCULAR SPIDER

SPIDER TELANGECTASIA

تعریف:

SPIDER ANGIOMA نوعی تلانزکتازی است که در سطح پوست دیده میشود.

اغلب حاوی یک لکه قرمز مرکزی و رادیاسیونهای قرمز رنگی است که از مرکز به اطراف کشیده میشوند.

اسپایدر انژیوما ضایعه ای نسبتا شایع و خوش خیم است. در ۱۰-۱۵٪ افراد سالم و بچه ها دیده میشود.

در موارد پاتولوژیک که معمولا بیشتر از سه ضایعه دیده میشود میتواند علامت سیروز کبدی و حتی وجود واریس مری ثانویه به آن باشد.

این ضایعه معمولا در صورت -گیدن- قسمت فوقانی تنه و بازوها دیده می شود و ممکن است در پشت دستها و انگشتان در بچه ها دیده شود .

علل ایجاد کننده :

اسپایدر انژیوما بعلت ایجاد نارسایی در اسفنکتر ارتریولهای پوستی ایجاد می شود. لکه قرمز مرکزی ارتریول گشاد شده و پاهای اسپایدری خارج شده وریدهای کوچک گشاد شده اند .

گشادی عروق بعلت سطح افزایش یافته استروژن در خون است که در سیروز کبدی-حاملگی و مصرف قرصهای ضد بارداری رخ می دهد.

۳۳٪ افراد سیروزی اسپایدر انژیوما دارند.

درمان:

معمولا بدون علامت است و خود بخود بهبود می یابد.

در حاملگی و مصرف OCP بعد از پیلان بارداری و بعد از قطع مصرف OCP ضایعه بهبود می یابد.

در سیروز بعد از پیوند کبد بهبود می یابد.

ضایعه در صورت با روشهای الکتروداایسکشن و لیزر بهبود می یابد که در موارد نادری اسکار کمی باقی می گذارد.

اسپایدر انژیوما بعد از درمان میتواند عود کند.