

اورژانس	زمان سوال (ثانیه): ←	
۱	بیمار آقای ۵۷ ساله با علائم تپش قلب و درد آنژین شدید مراجعه کرده است. در معاینه سمع قلب تاکیکارد و نامنظم است و در سمع ریه تا قسمت فوقانی را سمع می شود. در ECG ریتم AF با پاسخ بطنی ۱۷۰ در دقیقه و BP=120/75 می باشد. علائم بیمار از یک ساعت قبل شروع شده و بیمار سابقه AF نداشته. بهترین اقدام درمانی چیست؟	
۱	دیگوکسین وریدی	
۲	آمیودارون وریدی	
۳	DC Shock سینکرونیز	*
۴	درمان کامل آنتی کوآگولان همراه با بتابلوکر وریدی	
		منبع:
		توضیح:

اورژانس	زمان سوال (ثانیه): ←	
۲	آقای ۳۰ ساله با وزن ۵۰ کیلو گرم، دچار مار گزیدگی شده است و با شوک توسط همراهیان به بخش فوریت ها منتقل شده است. علیرغم تجویز ۲ لیتر نرمال سالین، بهبودی در وضعیت همودینامیک وی حاصل نمی شود، اقدام بعدی شما در جهت افزایش فشارخون وی کدام است؟	
۱	تجویز مجدد ۲۰۰۰CC نرمال سالین	
۲	تجویز ۲۰۰ mg هیدرو کورتیزون وریدی	
۳	تجویز ۵۰۰ CC آلبومین ۲۰٪ وریدی	*
۴	شروع انفوزیون دوپامین	
		منبع:
		توضیح:

اورژانس	زمان سوال (ثانیه): ←	
۳	خانم ۳۷ ساله با تنگی نفس حاد و شدید بدنبال خوردن خشکبار به اورژانس مراجعه کرده است. تاقیکاردی و تاقی پنه دارد، سیانوتیک است، سابقه آسم از ۱۵ سال قبل و چند بار بستری بعلت حمله شدید آسم و یک بار بستری در ICU با اینتوبیشن دارد. در طی یکسال گذشته مرتب تحت نظر بوده و اسپیرومتری نرمال داشته و فاقد علامت بوده است و نیاز به استفاده از داروی سالبوتامول استنشاقی نداشته است، کدام درمان در این مرحله انتخابی است؟	
*	۱	اپی نفرین زیر جلدی
	۲	سالبوتامول با نبولایزر
	۳	استروئید وریدی
	۴	ایپراتروپیوم برومید با نبولایزر
		منبع:
		توضیح: