

فرمت پیشنهادی word برای ورود سوالات و کلید یا پاسخ:


- خطوط جداول فقط برای نمایش قرار داده شده است.
- هر سوال در یک **جدول مستقل** درج شود و از **پاک کردن** خانه های جدول اکیداً خودداری شود.
- درج **علامت *** در خانه سمت راست هر گزینه، به منزله **جواب صحیح** بودن آن گزینه می باشد
- شماره سوال و گزینه ها به عنوان مرجع برای آنالیز سوالات در نظر گرفته میشود.
- در صورت **طرح سوال کمتر از ۴ گزینه**، صرفاً متن داخل گزینه های اضافی را پاک کنید و از حذف کردن ردیف گزینه ها خودداری نمایید.
- در صورت **طرح سوال بیشتر از ۴ گزینه**، می توانید بعد از گزینه چهارم، به تعداد مورد نیاز سطر اضافه کنید.
- ورود اطلاعات **منبع** اختیاری می باشد و در صورت درج منبع، برای داوطلب، در طول آزمون قابل مشاهده خواهد بود.
- ورود **توضیحات** اختیاری می باشد و مربوط به توضیح گزینه صحیح و یا راه حل مسئله بوده و در صورت درج توضیحات، بعد از آزمون و در صورت فعال کردن گزینه مربوطه توسط مدیر سامانه، برای داوطلب قابل مشاهده خواهد بود.
- در صورت **خالی گذاشتن خانه زمان هر سوال**، برنامه زمان یکسان بر اساس تعریف مدیر سامانه برای همه سوالات در نظر خواهد گرفت.
- **فاصله خالی بین جداول** به هیچ عنوان حذف نشود، در صورت اتصال دو جوبل به هم یکی از سوالات حذف خواهد شد.
- این فایل نمونه برای ۶۶ سوال طراحی شده است در صورت طرح سوال کمتر، حتماً **جداول اضافی** را پاک کنید و چنانچه به سوالات بیشتر از ۶۶ تا مورد نیاز است از جداول کپی گرفته و بعد از سوال ۶۶ اضافه نموده و شماره سوال را اصلاح نمایید.
- تعداد جدول در هر صفحه مهم نیست
- سطر اول، نام آزمون مرتبط قرار داده میشود.
- افزایش ارتفاع جدول بدلیل زیاد بودن متن سوال مشکلی را ایجاد نمی کند.
- تعداد جدول های درج شده صرفاً جهت راحتی کار بوده و در صورت کم شدن تعداد جدول ها و زیاد شدن آن مشکلی در ورود سوالات پیش نمی آید. (تعداد سوالات ورودی به تعداد جدول ها)

جنرال	زمان سوال (ثانیه): ←
۱	در خانم باردار برای درمان آسم مناسب ترین دارو کدام است؟
۱	تئوفیلین
۲	سالمترول
۳	تیوتروپیوم بروماید
۴	بودزوناید
*	
منبع:	هاریسون ۲۰۲۵- فصل ۲۹۸ آسم - ص ۲۲۲۷
توضیح:	دکتر زهرا رفیعی

جنرال


زمان سوال (ثانیه): ←

آقای ۳۷ ساله بدون سابقه بیماری قلبی - عروقی ولی سابقه میگرن به دلیل دردهای قفسه صدی به اورژانس مراجعه کرده است. نوار قلب بدو ورود و ۳۰ دقیقه بعد از بیمار گرفته شده است. در حال حاضر فاقد درد است. درمان مناسبتر کدام است؟ نوار قلب در بدو ورود



نوار قلب ۳۰ دقیقه بعد

۲



۱ آسپرین ۸۰ میلی گرم روزانه

۲ دیلتیازم ۶۰ میلی گرم BID *

۳ آتورواستاتین ۴۰ میلی گرم روزانه

۴ متورال ۵۰ میلی گرم BID

منبع: هاریسون ۲۰۲۵- فصل ۲۸۵- non STEMI- ص ۲۱۱۲

توضیح: دکتر زهرا رفیعی

جنرال	زمان سوال (ثانیه): ←
۳	خانم ۳۵ ساله بدون سابقه بیماری با تشخیص پانکراتیت حاد در اورژانس بستری می شود و بلافاصله مایع درمانی برای وی شروع می شود. در پیگیری بیمار کدام یک از موارد زیر نشان دهنده مایع درمانی کافی است؟
۱	HB:15/5gr/dl
۲	Urea:40 mg/dl
۳	HR:120 min
۴	Urine out put: 30cc/hr
منبع:	هاریسون ۲۰۲۵- فصل ۳۵۹ پانکراتیت- ص ۲۷۴۸-۲۷۴۷
توضیح:	دکتر زهرا رفیعی