

زمان سوال (ثانیه): ←	روماتولوژی		
<p>خانم ۳۵ ساله ای با شکایت ضعف عضلانی پروگزیمال در هر ۴ اندام که از ۳ ماه قبل شروع شده در بخش بستری است در معاینات رینود دارد و کف دستها به خصوص در سطح پالمار انگشتان پوست ضخیم و پوسته پوسته است قدرت عضلانی پروگزیمال کاهش یافته و زانو ها آرتريت دارند نتایج آزمایشات به شرح زیر است شایع ترین یافته همراه در این بیمار کدام است؟</p> <p>Wbc:7800 HB:13/5 AST:85(30) PLT:370000 ALT:90(30) LDH:2100(NL<450) CPK:2800(NL<170)</p>			۱۳
	۱		
	۲	*	
	۳		
	۴		
		منبع:	
		توضیح:	

زمان سوال (ثانیه): ←	روماتولوژی		
<p>آقای ۴۲ ساله ای با شکایت از ضعف خستگی و کاهش وزن و فنومن رینود و ضایعات پوستی برجسته به شکل پورپورا روی اندامهای تحتانی و پارستزی در هر ۴ اندام مراجعه کرده است آزمایشات به قرار زیر است:</p> <p>WBC:10200 HB:9 PLT:420000 U/A: WBC:2-3 RBC:20-23 PR:3+ UP24H:3500mg</p>	<p>انجام همه تست های آزمایشگاهی زیر در تشخیص کمک کننده است به جز؟</p>		۱۴
	آنتی بادی HCV	۱	
	آنتی سانترومر AB	۲	*
	فاکتور روماتوئید	۳	
	اندازه گیری سطح C3- C4	۴	
	منبع: هاریسون ۲۰۲۲، صفحه: ۱۰۲۵۰ استون: ۲۰۲۲		
	دکتر یزدی		توضیح:

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←	
۱۵	<p>آقای ۴۰ ساله ای با شکایت آفت دهانی و لنگش عروقی در اندامهای تحتانی مراجعه کرده است پاتولوژی ضایعات پوستی به نفع Sweet syndrome است. در مشاوره چشم پزشکی پان یوئیت دوطرفه گزارش شده است در معاینه مفصلی آرتريت دفورمان زانوها وجود دارد همه علائم در این بیمار با بیماری بهجت مطابقت دارد به جز؟</p>	
	۱ ضایعه پوستی	
*	۲ درگیری مفصلی	
	۳ درگیری عروقی	
	۴ درگیری چشمی	
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲، صفحه: ۲۸۱۸ پاراگراف: ۲۰۲۲	
توضیح:	دکتر یزدی	

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←	
۱۶	<p>خانم ۳۲ ساله ای با آرتريت مچ پاها از یک هفته قبل مراجعه کرده است در هیستوری سابقه بیماری و مصرف دارو ندارد در معاینه علاوه بر آرتريت هر دو مچ ضایعات مدور قرمز و برجسته اطراف مچ پاها وجود دارد آزمایشات به شرح زیر است :</p> <p>WBC:14000 HB:13 PLT:360000 ESR:50 U/A:NI</p> <p>مناسب ترین اقدام تشخیصی کدام است؟</p>	
	۱ چک Anti ccp	
	۲ اندازه گیری سطح اسید اوریک سرم	
*	۳ Chest X-ray	
	۴ Pelvic X-ray	
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲، صفحه: ۲۸۳۱-۲۸۳۰	
توضیح:	دکتر یزدی	


زمان سوال (ثانیه): ←	روماتولوژی	
	<p>خانم ۳۲ ساله ای به دلیل ابتلا به میوزیت التهابی از ۳ ماه قبل تحت درمان با پردنیزولون ۴۰ میلی گرم روزانه قرار گرفته و بیماری در remission قرار داشته است ۲ هفته اخیر از تشدید ضعف عضلات پروگزیمال اندامهای تحتانی شاکی بوده است در آزمایشات همراه آنزیمهای عضلانی بیمار طبیعی بوده است و در مطالعات هدایت عصبی شواهد تحریک پذیری غشا عضله وجود ندارد بهترین اقدام درمانی کدام است ؟</p>	۱۷
	افزایش دوز کورتیکواستروئید	۱
	پلاσμα فرز	۲
	کاهش دوز کورتیکواستروئید	۳ *
	تجویز ایمونو گلوبولین وریدی	۴
	هاریسون ۲۰۲۲، پاراگراف: ۲۸۲۴	منبع:
	دکتر یزدی	توضیح:

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
خانم ۶۰ ساله با شرح حال سه ماهه از تب و کاهش وزن و درد در چشم راست همراه با سرگیجه واقعی و سرفه و خشونت صدا مراجعه کرده است در معاینه بیمار pale است در آزمایشات سرولوژی بیمار به شرح زیر است:	۱۸
RF: - FANA: - Anti MPO: - Anti PR3: - CANCA: + Anti ccp: -	
محتملترین تشخیص بیمار کدام است؟	
۱ لوپوس سیستمیک	
۲ سندرم شوگرن	
۳ گرانولوما توز پلی آنژئیت	
۴ پلی کندریت راجعه	*
منبع: هاریسون ۲۰۲۲، صفحه: ۲۸۲۶	
توضیح: دکتر یزدی	

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
آفاق ۵۶ ساله مورد بیماری ایسکمیک قلبی، استئو آرتريت شديد زانو دارد، تمام داروهای زیر از نظر قلبی safe می باشد به جز؟	۱۹
۱ ناپروکسن ۲۵۰ میلی گرم ۲ بار در روز	
۲ سلوکسیب ۱۰۰ میلی گرم روزانه	
۳ سلوکسیب ۲۰۰ میلی گرم دو بار در روز	*
۴ استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز	
منبع: هاریسون ۲۰۲۲،	
توضیح: دکتر حسن آقایی	

	روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
۲۰	کدامیک از ضایعات زیر در بیماری تب فامیلی مدیترانه ای دیده می شود؟	
*	۱	erysipelas
	۲	eczema
	۳	hemorrhagic bulla
	۴	palpable purpura
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲ فصل ۳۶۹ صفحه ۴ پاراگراف ۴	
توضیح:	دکتر حسن آقایی	

	روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
۲۱	آقای ۴۵ ساله با حملات اپی زودیک آرتریت در مچ دستها مراجعه کرده است. در معاینه تندر نس در هر دو مچ دارد. تستهای RF , AntiCCPAb منفی است. در گرافی دست استئوفیت قلابی شکل در متاکارپ ۳ و ۲ دارد. محتملترین تشخیص کدام است؟	
*	۱	هموکروماتوز
	۲	آرتریت روماتوئید
	۳	استئوآرتریت اولیه
	۴	آرتریت پسوریاتیک
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲ قسمت hand pain approach	
توضیح:	دکتر حسن آقایی	

زمان سوال (ثانیه): ←	روماتولوژی	
شکل زیر کدام معاینه را در شک به تاندینیت روتاتور کاف نشان می دهد؟		
 <p style="text-align: right; font-size: small;">© 2000 Marcia Harstock</p>		
NEER test	۱	*
drop arm test	۲	
yergason test	۳	
empty can test	۴	
منبع: هاریسون ۲۰۲۲ قسمت درد شانه صفحه ۴		
توضیح: دکتر حسن آقایی		

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
همه بیماری های زیر می توانند داکتیلیت ایجاد کنند به جز؟	۲۳
psoriatic arthritis	۱
sarcoidosis	۲
sickle cell anemia	۳
hemophilia	۴
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲ قسمت ۲۰ approach Hand
توضیح:	دکتر حسن آقایی

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
در درمان استئوآرتریت همه درمانهای زیر از نظر قلبی نسبتا safe می باشد به جز؟	۲۴
ناپروکسن ۲۵۰ دو بار در روز	۱
سلوکسیب ۱۰۰ روزانه	۲
سلوکسیب ۲۰۰ دو بار در روز	۳
استامینوفن ۵۰۰ روزی ۳ بار	۴
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲ قسمت ۲۰ OA فارماکوتراپی
توضیح:	دکتر حسن آقایی