

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
خانم ۳۰ ساله مورد بیماری اسکلوودرمی سیستمیک برای پی گیری مراجعه کرده است. در معاینه تعداد تلانژکتازیهای بیمار افزایش پیدا کرده است. بررسی کدامیک از ارگانهای زیر ضروری است؟	۹۳
۱ درگیری ریوی از نظر ILD	
۲ درگیری شریان پولمونر (PAH)	*
۳ گرافی دست از نظر خوردگی انتهای انگشتان	
۴ بررسی از نظر درگیری مغزی	
منبع: هاریسون ۲۰۲۲ - قسمت (figure 360-9) Skin features	
توضیح:	

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
کدامیک از داروهای زیر می تواند ایجادکننده ی سندروم های شبه لوپوس از جمله ضایعات دمیلیزان مغزی باشد؟	۹۴
۱ ریتوکسیماب	
۲ اینفلیکسیماب	*
۳ متوتروکسات	
۴ بلیوماب	
منبع: هاریسون ۲۰۲۲ - درمان A&A (صفحه دوم پاراگراف ۳)	
توضیح:	

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
در تمام بیماری های زیر ممکن است زخم دهانی وجود داشته باشد به جز:	۹۵
۱ آرتریت واکنشی	
۲ آرتریت پسوریاتیک	*
۳ بیماری لوپوس	
۴ اسپوندیلیت ناشی از IBD	
منبع: هاریسون ۲۰۲۲	
توضیح:	

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
۹۶	بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید با درد انگشتان پاها مراجعه کرده است. در معاینه، در ساق پاها لیودورتیکولاریس دیده می شود. انگشتان ۴ و ۵ پاها گانگرن شده است. با توجه به تشخیص مطرح شده، همهی موارد زیر می تواند وجود داشته باشد به جز:
۱	کمپلمان پایین
۲	کمپلمان بالا
۳	تیتر AnticcpAb بالا
۴	تیتر RF بالا
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲- صفحه ۲۷۵۳- پاراگراف واسکولیت
توضیح:	

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
۹۷	بیماری که early RA برایش مطرح شده است، با وجود ۶ ماه درمان با متروتروکسات، همچنان بیماری فعال دارد. همه درمانهای زیر را در این مرحله توصیه میکنید به جز؟
۱	اضافه کردن لفلونامید
۲	اضافه کردن اینفلیکسیماب
۳	اضافه کردن توسیلیزومب
۴	اضافه کردن سولفاسالازین
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲- صفحه ۲۷۶۴
توضیح:	

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←	
۹۸	خانم ۳۰ساله به علت تب و درد و تورم در مفاصل متاکارپوفالانژیال و مچها و تنوسینویت در ناحیه پشت دستها، از دو روز قبل مراجعه کرده است. در معاینه، ضایعات وزیکولارهموراژیک، در ساعد و پشت دستها دیده می شود. وی شرح حال urethritis را در دو هفته گذشته می دهد. مهره های کمر، درگیر نیستند. محتمل ترین تشخیص کدام است؟	
۱	psoriatic arthritis	
*	۲	diffuse gonococcal infection
	۳	sarcoidosis
	۴	آرتریت روماتوئید
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲- قسمت SPA و عفونی	
توضیح:		

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←	
۹۹	آقای ۵۷ساله مورد اسپوندیلوآرتروپاتی پسوریاتیک، که کمبود G6Pd هم دارد اخیراً دچار نارسایی قلبی پیشرفته شده است. وی پلی آرتریت دارد و کاندید درمان می باشد. کدامیک از داروهای زیر را می توان برای او تجویز کرد؟	
*	۱	متوتروکسات
	۲	اینفلیکسیماب
	۳	سلکو کسپیب
	۴	سولفاسالازین
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲- ستون راست پاراگراف آخر	
توضیح:		

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
۱۰۰	بیمار لوپوس به علت ضعف و خستگی بیش از حد، مراجعه کرده است. در معاینه، علائم حیاتی stable است. قلب و ریه طبیعی است. آزمایشات بیمار، طبیعی است. علیرغم درمان های استاندارد C3 , C4 - AntidSDNA >100 پائین است. درگیری ارگان مازور ندارد. کدام درمان زیر مناسب است؟
۱	adalimumab
* ۲	belimumab
۳	سولفاسالازین
۴	سیکلوفسفامید
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲ - قسمت درمان های conservative
توضیح:	

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
۱۰۱	همه موارد زیر در سندروم آنتی فسفولیپید همراه با ریسک بیشتر ترومبوز می باشد، به جز:
* ۱	آنتی بادی کاردیولیپین از نوع Igm
۲	تعداد بیشتر اوتوآنتی بادی های مثبت
۳	تیترا متوسط تا بالای آنتی بادی ها
۴	تداوم حضور آنتی بادی ها
منبع:	
توضیح:	

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
خانم ۳۰ساله مورد بیماری لوپوس، تحت درمان با پردنیزولون و هیدروکسی کلروکین، در آزمایشات Anticardiolipine Ab Ig با تیتراژ ۱۰۰ دارد. سابقه‌ای از سقط نمی‌دهد. شرح حالی از ترومبوز نیز نداشته است. اقدام بعدی کدام است؟	
۱	شروع وارفارین ۵ میلی‌گرم
۲	شروع آسپیرین با دوز ۳۰۰ میلی‌گرم
۳	شروع آپیکسابان
*	۴ شروع آسپیرین با دوز ۸۰ میلی‌گرم
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲- درمان Aps پاراگراف ۳
توضیح:	

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
خانم ۳۵ مورد بیماری شوگرن ذکر می‌کند که از ۶ ماه قبل دچار درد و سفتی پاروتید چپ شده است همه موارد زیر با این تشخیص احتمالی همراهی دارد؟ به جز	
۱	آتروفی زبان
۲	آنتی Ro آنتی بادی بالا
*	۳ نوتروفیل فراوان در غدد بزاقی
۴	کمپلمان پایین (C4)
منبع:	صفحه تظاهرات بالینی
توضیح:	

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
آقای ۳۰ساله با سابقه بیماری کولیت اولسراتیو از ۱۰ سال قبل، اکنون با درد و تورم مچ‌های پاها و زانوهای آمده است. مدتی است که اسهال و تنموس دارد و در کولونوسکوپی جدید، فعالیت بیماری، بالا گزارش شده است. برای کنترل دردهای مفصلی، همه درمان‌های زیر مناسب است به جز:	
*	۱ ناپروکسن
۲	آدالیموماب
۳	سولفاسالازین
۴	پردنیزولون
منبع:	
توضیح:	

