

سوال شماره ۱۱:

طراح: آقای دکتر قاسم زاده

دو بیمار دیابتی با سن حدوداً ۶۰ سال با سابقه یک ماهه تب ، سرفه در بخش عفونی بستری می شوند. در بیمار B در نیمه فوقانی همی توراکس چپ کاهش صداهای تنفسی و در بیمار D در قواعد هر دو ریه روال سمع می شود گرافی قفسه سینه دو بیمار در تصویر آورده شده است. محتمل ترین تشخیص هر کدام چیست ؟

پاسخ سوال شماره ۱۱:

تشخیص هر دو بیمار سل ریوی بود که با اسمیر اسید فاست خلط و کشت خلط تأیید شدند. نکته مهم این است که مهمترین شکایات در بیماران سلی تب ، سرفه و کاهش وزن می باشد که باید مدنظر قرار گیرد.

در گرافی قفسه سینه بیماران سل ریوی هر الگویی قابل انتظار است . در سل ثانویه در بیش از ۸۰ درصد بیماران لوب فوقانی درگیر می شود و ضایعات به شکل انفیلتراسیون Patchy یا Consolidation و یا به شکل Caritary است. که در شکل تیپیک در تصویر B قابل مشاهده هستند. در تصویر D antensive Paranchynal consolidation در هر دو ریه مشاهده می شود.

بیمار B



بیمار D

