

سوال شماره ۱۲:

طراح: آقای دکتر قاسم زاده

مرد ۳۰ ساله ای که در کشتارگاه کار می کند با شکایت از ضایعه ای در ساعد دست راست که در تصویر A آمده است به شما مراجعه می کند. وی بیان می دارد که ابتدا به شکل نودول برجسته خارش دار بوده و هیچگونه علامت همراه دیگری نداشته است. هیستوری از بیماری قبلی یا مصرف دارو ندارد و در معاینه فیزیکی نکته قابل توجهی مشاهده نشد.

ضایعه به تدریج به شکل B تبدیل می شود و سرانجام بعد از ۳ هفته بهبود می یابد. تشخیص شما چیست؟

تصویر A



تصویر B



پاسخ سوال شماره ۱۲:

تشخیص: Orf Disease

بیماری توسط Parapoxvirus ایجاد می شود که می تواند انسان و حیوان را آلوده کند. معمولاً ویروس در بهار یا تابستان در گوسفند و در پاییز و ابتدای زمستان در انسان باعث بروز بیماری می شود. آلودگی در انسان معمولاً در پوست دست کسانی که به نحوی با گوسفند یا پوست و یا کله و پاچه آن کار می کند مشاهده می شود. بعد از یک دوره کمون ۵ تا ۷ روزه ضایعه به شکل ماکول خارش دار شروع می شود و در عرض مدت مشابه تبدیل به پاپول می شود. در هفته سوم اولسره می شود که به مرحله حاد بیماری معروف است هیچگونه علامت سیستمیک ایجاد نمی کند. در عرض هفته چهارم تا

ششم بهبودی حاصل می شود. بیماری یک عفونت خوش خیم و محدود شونده است و نیاز به درمان دارویی ندارد.

هر چند ویروس را می توان با PCR شناسایی کرد. ولی تشخیص بر اساس شرح حال و معاینه فیزیکی انجام می شود.