

سوال شماره ۲۰:

طراح: خانم دکتر جمالیزاده

آقای ۲۳ ساله که با ضایعه زیر مراجعه کرده است در بدو ورود بیمار تب دار نبوده و علائم حیاتی **stable** دارد.



الف) محتمل ترین تشخیص چه می باشد؟

ب) در چه شرایطی ایجاد می شود؟

ج) تشخیص افتراقی ضایعه فوق را بنویسید.

پاسخ سوال شماره ۲۰:

الف) لنفانژیت التهاب سیستم لنفاوی است که به دنبال یک عفونت در یک محل دورتر اتفاق می افتد و شایع ترین علت آن استریپتوکوک پیوژن می باشد. اگر چه می تواند ناشی از استاف آرئوس، ارگانیسیم های گرم منفی و عفونت قارچی *sporothrix schenckii* نیز باشد. علائم آن به صورت اریتم خطی قرمز رنگ همراه با گرمی و لنفانژیت می باشد. ممکن است همراه با تب و لرز، درد و تورم ناحیه نیز باشد.

ب) در اثر تلقیح پوستی میکروارگانیسیم و انتشار لنفاوی ناحیه ای اتفاق می افتد. می تواند در سیستم لنفاوی نرمال (در اثر ترومای موضعی یا عفونت پوست) یا در اثر آسیب سیستم لنفاوی + انسداد لنفاوی ناشی از جراحی، بدخیمی، رادیوتراپی یا تروما (مثال شایع آن آسیب لنفاوی ناشی از برداشتن ورید صافن در CABG، و دیسکسیون لنف نود آگزیلاری در رادیکال ماستکتومی می باشد)

ج) اگر در محل ورید صافن بزرگ باشد می تواند با ترومبوفلبیت اشتباه شود، سلولیت، درماتیت تماسی، فاشئیت نکروزان و میوزیت از تشخیص افتراقی های دیگر می باشند.