


سوال شماره ۶:

طراح: خانم دکتر جمالیزاده

بیمار آقای ۷۰ ساله ای است با سابقه دیابت و هایپر تنشن و CVA هموراژیک که با درد فشارنده قفسه سینه با انتشار به فک تحتانی که ماهیت ON/OFF داشته از نیم ساعت قبل به اورژانس مراجعه میکند علایم حیاتی بیمار: BP:180/110 هر دو دست مشابه PR:120 داشته نوار قلب بیمار به صورت زیر است:



الف) تشخیص چه می باشد؟

ب) چه اقدامات درمانی در ارتباط با این بیمار انجام می دهید.

پاسخ سوال شماره ۶:

الف) با توجه به **st elevation** در لیدهای قدامی (V1-4) و شرح حال بیمار، سکته حاد قدامی قلب جهت بیمار مطرح است.

ب) در سکته حاد قلبی جدا از درمان های انتی ایسکمیک (ACE I/TNG/ASA/PLAVIX/B BLOCKER و ...) ریپرفیوژن باید مد نظر باشد اگر بیمار در مرکز مجهز به **PCI** باشد که باید طی ۹۰ دقیقه اول **PRIMARY PCI** شود. در صورتی که فیبرینولیتیک کنتراندیکاسیون داشته باشد (در بیمار ما با سابقه هموراژیک استروک، فیبرینولیتیک ممنوع است)، دچار کاهش سطح هوشیاری و نارسایی قلبی شدید شده باشد باید هر چه سریع تر به مرکز مجهز به **PCI** انتقال یابد.