


## سوال شماره ۷:

طراح: خانم دکتر جمالیزاده

بیمار آقای ۶۹ ساله ای است مورد شناخته شده دیابت که به دنبال درد اپیگاستر و رترواسترنال فشارنده از ۱ ساعت قبل با انتشار به شانه چپ همراه تهوع استفراغ و تعریق سرد وارد اورژانس میشود در معاینه علائم حیاتی: BP:140/90 و PR:100 و O2 SAT:91% بیمار JVP:UP دارد. سمع قلب و سمع ریه ها نرمال است نوار قلب بیمار به شکل زیر است:



الف) تشخیص چه می باشد؟

ب) چه اقدامات تشخیصی پس از رویت این نوار قلب در اورژانس لازم است؟

## پاسخ سوال شماره ۷:

### الف) Acute inferoposterior MI

ب) با توجه به شواهد نوار قلب و JVP UP که عللی مثل تامپوناد با معاینه قلب جهت بیمار رد میشود احتمال Right MI همزمان که در ۱/۳ بیماران همزمان با Inferior MI نارسایی قلب راست ثانویه به آن وجود دارد. لذا گرفتن ECG سمت راست الزامی هست. در Right MI به علت ریسک برادی کاردی و هایپوتنشن ناشی از اثر عصب واگ در درمان آن ها از TNG و بتا بلوکر استفاده نمی شود. در این بیمار به جز درمان ضد ایسکمی حتما باید ریپرفیوژن مد نظر باشد PCI یا فیبرینولیتیک هر دو بر حسب شرایط و امکانات برای بیمار باید مد نظر باشد.