

اورژانس	
بیمار آقای ۳۵ ساله با درد شکمی در ناحیه اپی گاستر از روز گذشته مراجعه کرده است. که بدنبال مصرف الکل تشدید شده است و به پشت تیر می کشد ، سابقه مصرف جم فیبروزیل را از سالها قبل می دهد. در معاینات تندرست اپی گاستر دارد.	۶۴
BP=100/60 mmHg PR=100/min RR=24/min T=38.1°C Bili D=0.4	WBC=16000 Hb=18 Plt=350000 TG=1100
BUN=40 Cr=1.5 B.S=150 Chol=250	AST=256 ALT=200 Alk.p=180 Bili T=1.3
کدامیک از درمانهای زیر در این مرحله کاربرد دارد؟	
الف	فنوفیرات
ب	افزایش جم فیبروزیل
ج	انسولین رگولار
د	ایمی پنم
منبع:	

اورژانس		
۶۵	<p>بیمار خانم ۴۰ ساله که بعلت یبوست و اتساع شکم با شما مشاوره شده است. نامبرده دو روز قبل تحت عمل جراحی بر روی ستون مهره های کمری قرار گرفته است. گرافی زیر از بیمار بعمل آمده.</p>  <p>همه ی اقدامات زیر مناسب است بجز:</p>	
الف	بررسی الکترولیت های سرم	
ب	تعبیه لوله نازوگاستریک	
ج	قطع مسکن های اپیوئیدی	
د	تجویز نفوستیگمین وریدی	
منبع:		

اورژانس	
خانم ۶۸ ساله با سابقه کانسر ریه متاستاتیک به مغز ، با احساس تنگی نفس ناگهانی و درد قفسه مراجعه کرده است. BP=not detectable P.R=140/min RR=24/min T=38°c	۶۶
کدام اقدام درمانی با توجه به محتمل ترین تشخیص ارجح است؟	
الف	سرم نمکی دو لیتر در ساعت اول
ب	دوپامین و دوباتامین
ج	اپی نفرین
د	فیبرینولیتیک
منبع:	