


۹- فرمت پیشنهادی word برای ورود سوالات و کلید یا پاسخ:

- خطوط جداول فقط برای نمایش قرار داده شده است.
- هر سوال در یک **جدول مستقل** درج شود و از **پاک کردن** خانه های جدول اکیداً خودداری شود.
- درج علامت \* در خانه سمت راست هر گزینه، به منزله **جواب صحیح** بودن آن گزینه می باشد
- شماره سوال و گزینه ها به عنوان مرجع برای آنالیز سوالات در نظر گرفته میشود.
- در صورت **طرح سوال کمتر از ۴ گزینه**، صرفاً متن داخل گزینه های اضافی را پاک کنید و از حذف کردن ردیف گزینه ها خودداری نمایید.
- در صورت **طرح سوال بیشتر از ۴ گزینه**، می توانید بعد از گزینه چهارم، به تعداد مورد نیاز سطر اضافه کنید.
- ورود اطلاعات **منبع** اختیاری می باشد و در صورت درج منبع، برای داوطلب، در طول آزمون قابل مشاهده خواهد بود.
- ورود **توضیحات** اختیاری می باشد و مربوط به توضیح گزینه صحیح و یا راه حل مسئله بوده و در صورت درج توضیحات، بعد از آزمون و در صورت فعال کردن گزینه مربوطه توسط مدیر سامانه، برای داوطلب قابل مشاهده خواهد بود.
- در صورت **خالی گذاشتن خانه زمان هر سوال**، برنامه زمان یکسان بر اساس تعریف مدیر سامانه برای همه سوالات در نظر خواهد گرفت.
- **فاصله خالی بین جداول** به هیچ عنوان حذف نشود، در صورت اتصال دو جوبل به هم یکی از سوالات حذف خواهد شد.
- این فایل نمونه برای ۶۶ سوال طراحی شده است در صورت طرح سوال کمتر، حتماً **جداول اضافی** را پاک کنید و چنانچه به سوالات بیشتر از ۶۶ تا مورد نیاز است از جداول کپی گرفته و بعد از سوال ۶۶ اضافه نموده و شماره سوال را اصلاح نمایید.
- تعداد جدول در هر صفحه مهم نیست
- سطر اول، نام آزمون مرتبط قرار داده میشود.
- افزایش ارتفاع جدول بدلیل زیاد بودن متن سوال مشکلی را ایجاد نمی کند.
- تعداد جدول های درج شده صرفاً جهت راحتی کار بوده و در صورت کم شدن تعداد جدول ها و زیاد شدن آن مشکلی در ورود سوالات پیش نمی آید. (تعداد سوالات ورودی به تعداد جدول ها)

اورژانس	زمان سوال (ثانیه): ←
۱	مرد میانسالی با افت سطح هوشیاری در منزل توسط EMS به اورژانس آورده شده است. علائم حیاتی بیمار پایدار است. در معاینه نورولوژیک مردمک های pinpoint با قطر کمتر از 1mm دیده می شود. کدام مورد به عنوان تشخیص افتراقی مهم مطرح است؟
* ۱	Pontine hemorrhage
۲	Ingestion of drug with anticholinergic activity
۳	Severe midbrain damage
۴	Supratentorial mass
منبع:	کتاب هاریسون ۲۰۱۸ صفحه ۲۰۷۲ ستون چپ پاراگراف ۱ و ۲
توضیح:	:

اورژانس	زمان سوال (ثانیه): ←
۲	خانم ۵۰ ساله ای مبتلا به دیابت و بیماری انسدادی مزمن ریوی پس از افت سطح هوشیاری با تشخیص sepsis با منشا زخم پای دیابتی گانگرنه در بیمارستان بستری شده است. با نظر سرویس جراحی آمپوتاسیون دیستال اندام تحتانی انجام شده و بیمار به صورت اینتوبه و با دریافت متناوب داروهای سداتیو و آنالژزیک به بخش ارجاع داده می شود. صبح روز بعد بیمار دچار افت SPO2 و افت فشار خون می شود. در تصویر زیر نمودارهای ونتیلاتور را مشاهده می کنید. همه اقدامات درمانی برای بیمار فوق توصیه می شود بجز:
۱	افزایش دوز داروی سداتیو
۲	افزایش دوز داروی آنالژزیک
۳	کاهش RR دستگاه
* ۴	افزایش زمان دم نسبت به زمان بازدم
منبع:	هاریسون ۲۰۱۸ صفحه ۲۰۲۸ ستون چپ و راست پاراگراف ۳ سطر ده
توضیح:	:



اورژانس	زمان سوال (ثانیه): ←
۳	همه موارد زیر در درمان مبتلا به ARDS توصیه می شود <u>بجز</u> ؟
۱	Diuretics
۲	Glucocorticoids *
۳	High PEEP
۴	Prone positioning
منبع:	هاریسون ۲۰۱۸ صفحه ۲۰۳۴ ستون چپ جدول ۳-۲۹۴
توضیح	
:	