

سوالات داخلی (اورژانس) امتحان میان دوره دستیاران گروه داخلی بهمن ۹۸

اورژانس	
خانم ۴۵ ساله مبتلا به دیابت بعلت تب، سوزش ادرار، کاهش تدریجی سطح هوشیاری و کاهش حجم ادرار از یک روز قبل به اورژانس انتقال یافته است. علائم حیاتی در زمان ورود: BP=۷۰/۴۰ mmHg ، PR=۱۴۰ / min ، RR=۴۰/min در دقیقه و SPO ₂ =۸۵٪ است. علیرغم دریافت یک لیتر نرمال سالین فشار خون سیستولی کمتر از ۹۰ میلیمتر جیوه و CVP کمتر از ۱۵ میلیمتر جیوه و بیکربنات خون ۱۸ میلی اکی والان است. در ادامه درمان تجویز کدامیک منطقی تر است؟	۱
الف	نرمال سالین
ب	اپی نفرین
ج	دوپامین
د	بیکربنات سدیم

اورژانس	
آقای ۶۷ ساله مبتلا به لیμφوما و تحت کموتراپی با شکایت تب و بی حالی از روز گذشته مراجعه کرده است. در معاینه تب دارد است. و SPO ₂ ۸۸ درصد می باشد در آزمایشات تعداد نوتروفیل مطلق ۳۰۰ می باشد. انجام همه موارد زیر درست است به جز:	۲
الف	کشت خون
ب	معاینه حفره دهان
ج	اکسیژن درمانی
د	اندازه گیری دمای رکتال

آقای ۷۵ ساله متلا به فیبریلاسیون دهلیزی و هیپرتانسیون و سابقه بیماری انسدادی کرونر، با شکایت درد پشت مراجعه کرده است. درد بیمار بصورت حاد بوده و بیمار را از خواب بیدار کرده است. علائم حیاتی وی بصورت زیر است


BP=۱۸۶/۹۴

PR=۱۱۲

RR=۱۳

T=۳۷,۵ سانتی گراد

جهت بیمار سی تی آنژیوگرافی انجام شده که در تصویر زیر ملاحظه می فرمایید قدم بعد جهت وی کدام است؟



الف	شروع هپارین با دوز درمانی
ب	شروع هیدرالازین وریدی
ج	شروع اسمولول
د	انجام اکوکاردیوگرافی

پاسخنامه

سوال	پاسخ
۱	۱
۲	۴
۳	۳