

جنرال	
<p>۱ خانمی ۶۵ ساله با سابقه نارسایی قلبی از ۳ ماه قبل با $EF=20\%$ مراجعه کرده است و از تنگی نفس پایدار هنگام بالا رفتن از پله مراجعه کرده است. تحت درمان با قرص فورازمایید $80mg$ روزانه، کارودیلول $12.5mg$ هر دوازده ساعت، والزارتان $160mg$ هر دوازده ساعت و اسپیرونولاکتون $50mg$ روزانه می باشد، CVP و معاینات طبیعی می باشد.</p> <p>BP=120/80 HR=85 BMI=27</p> <p>BMI (از ویژگی قبل تغییر نکرده است) مناسب ترین اقدام درمانی برای وی کدام است؟</p>	
الف	اضافه کردن ایوآرآدین
ب	کاهش دوز والزارتان
ج *	افزایش دوز کارودیلول
د	افزایش دوز فورازمایید
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲ صفحه ۱۹۴۷ ستون ۱ پاراگراف ۱ سطر ۳ تا ۱۰ دکتر امیر مبصر فر

جنرال	
بیمار آقای ۳۷ ساله که با کاهش سطح هوشیاری، تهوع و استفراغ مراجعه کرده است در آزمایشات بیمار	۲
ALK=375 BL=T:15 P:20 AIT=2710 AST=2560 PTI=50 PT=28 Ne=5.3	
همه درمان های زیر در افزایش میزان بقا موثر هستند <u>بجز</u> ؟	
آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک	الف
برقراری تعادل مایعات	ب
لاکتولوز خوراکی	ج
گلوکوکورتیکوئیدها	د
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲ صفحه ۲۵۸۰ دکتر سهیلا ترابیان

جنرال	
بیماری که با non ST elevation MI مراجعه کرده است و سابقه TIA دارد تجویز کدامیک از داروهای ضد پلاکتی زیر کنتراندیکاسیون دارد؟	۳
کلوپیدوگرل	الف
آسپرین	ب
پراسوگرل	ج
تیکاگرلور	د
منبع:	هاریسون ۲۰۲۲ صفحه ۲۰۵۰ فصل ۲۷۴ سطر ۵ دکتر سهیلا ترابیان