

عفونی	
بیمار ۲۵ ساله با سابقه لنفوم که در حال حاضر تحت شیمی درمانی است با تب بالا $WBC=500$ و $PMN:10\%$ بستری می شود، بیمار از ۳ روز قبل تب دار بوده و دچار ضایعه پوستی شده است براساس شرح حال و ضایعه پوستی که	۱
	
مشاهده می کنید محتمل ترین عامل این بیماری کدام است؟	
الف	استافیلوکوکوس اورئوس
ب *	پسودومونا آئروژینوزا
ج	کاندیدا آلبیکنس
د	آسپرژیلوزیس
منبع:	صفحه ۹۹۷ ستون ۲ پاراگراف ۳ خط ۳ دکتر مهرداد فرخ نیا

عفونی	
کدام واکسن در افراد بالای ۶۰ سال توصیه می شود؟	۲
الف	varicella
ب	MMR
ج	Live Influenza
د	HPV
منبع:	صفحه ۹۸۴ figure ۱-۱۲۳ دکتر مهرداد فرخ نیا

عفونی	
۳	جهت درمان سرپایی پنومونی اکتسابی از جامعه بدون بیماری زمینه ای کدام گزینه ارجح است؟
*	الف) آموکسی سیلین + داکسی سیکلین
	ب) آزیترومایسین + کلیندامایسین
	ج) سفکسیم + کلاریترومایسین
	د) لووفلوکساسین به تنهایی
منبع:	صفحه ۱۵۱۱ table ۴-۱۲۶ دکتر مهرداد فرخ نیا

عفونی	
۴	همه ی یافته های زیر در پی گیری درمان پنومونی ناشی از ونتیلاتور طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت مفید است <u>بجز</u> ؟
*	الف) انجام گرافی مجدد ریه
	ب) بررسی وضعیت اکسیژناسیون
	ج) بررسی روزانه تب بیمار
	د) میزان ترشحات ریوی
منبع:	صفحه ۱۰۱۹ ستون ۱ پاراگراف ۵ خط ۴ دکتر فرخ نیا

عفونی	
۵	کدام جمله در مورد پنومونی پنوموکوکی صحیح است؟
	الف) احتمال مثبت شدن کشت خون بالاست
	ب) اختصاصیت تست آنتی ژن ادراری پنوموکوک در بچه ها بیشتر است
*	ج) Empyema شایع ترین عارضه Focal بیماری است
	د) همیشه ابتدا به تغییرات گرافی به صورت محدود یا گسترده دیده می شود
منبع:	صفحه ۱۱۷۴ ستون ۲ پاراگراف ۳-۴-۵ صفحه ۱۱۷۵ ستون ۱ پاراگراف ۳ دکتر میثم یوسفی

عفونی	
۶	آقای ۳۰ ساله حدود ۴ ساعت بعد از مصرف، سالاد سیب زمینی با شکایت از تهوع و استفراغ شدید مراجعه نموده است همچنین شرح حال یک نوبت اسهال آبکی با حجم زیاد را می دهد. در معاینه تب دار نیست BP = 125/70mmhg کاملاً هوشیار است در کدامیک از نمونه های زیر احتمال یافتن عامل ایجاد کننده بیماری بیشتر است؟
الف	مدفوع
ب	خون
ج	غذای مصرف شده
د	ترشحات دئودنوم
منبع:	صفحه ۱۱۸۳ ستون ۲ پاراگراف ۴ دکتر میثم یوسفی

عفونی	
۷	آقای ۳۵ ساله مبتلا به HIV جهت تزریق واکسن پنوموکوک کدام گزینه صحیح است؟
الف	تزریق واکسن ۲۳ ظرفیتی و بعد از ۸ هفته یک نوبت واکسن ۱۳ ظرفیتی
ب	تزریق ۲ نوبت واکسن ۱۳ ظرفیتی به فاصله یک ماه
ج	تزریق واکسن ۱۳ ظرفیتی و سپس واکسن ۲۳ ظرفیتی به فاصله ۵ سال بعد
د	تزریق ۲ نوبت واکسن ۲۳ ظرفیتی به فاصله ۵ سال
منبع:	صفحه ۱۱۷۷ ستون ۱-۲ دکتر میثم یوسفی

عفونی	
۸	در صورتی که یکی از اعضای خانواده دچار مننژیت هموفیلوس آنفلانزا تیپ B شده باشد، جهت پروفیلاکسی دارویی کدام جمله صحیح است؟
الف	سایر اعضای خانواده نیاز به پروفیلاکسی ندارند.
ب	در صورت وجود یک کودک کمتر از ۴ سال واکسینه نشده باید به تمام افراد خانواده پروفیلاکسی دارویی تجویز شود.
ج	در صورتیکه وجود یک کودک ۴ سال واکسینه نشده باید فقط به بچه ۴ سال آن خانواده پروفیلاکسی تجویز شود
د	کلیه اعضا خانواده واکسن Haemophilus influenzae دریافت نمایند
منبع:	

عفونی	
۹	احتمال ایجاد اسهال ناشی از C.difficile با کدامیک از انتی بیوتیک های زیر بیشتر است؟
الف	آمیکاسین
ب	سیپروفلوکساسین
ج	آزیترومایسین
د	مترونیدازول
منبع:	صفحه ۱۱۳۳ ستون دوم پاراگراف سوم خط ۱۰ دکتر ایمان قاسم زاده

عفونی	
۱۰	آقای ۱۷ ساله با گزش گربه خانگی از ۴ ساعت قبل مراجعه می کند در معاینه جای زخم و خونریزی جزئی مشخص است چه اقدامی مناسب است؟
الف	تا زمان شروع علائم سلولیت اقدام خاصی لازم نیست
ب	شستشو با آب و صابون
ج	شروع درمان با کلیندامایسین
د	شروع درمان با کواموکسی کلاو
منبع:	هاریسون صفحه ۱۰۳۹ جدول ۱۲۹-۲ دکتر ابوسعیدی

عفونی	
۱۱	تشخیص احتمالی اندوکاردیت در کدامیک از موارد زیر بیشتر است؟
الف	تب ۳۸ > درجه و دیده شدن Osler nodes و کشت خون مثبت با باکتری فوزیفرم
ب	کشت خون مثبت با استرپتوکوک ویریدانس و آرترالژی مفاصل کوچک و Roth spot و BUN ، CR افزایش یافته در سرم بیمار در ۲ نمونه جداگانه
ج	کشت خون مثبت با استافیلوکوک طلایی و RF+ و تب بالای ۳۸ درجه سانتی گراد و سردرد شدید ضربان دار
د	تب بالای ۳۸ درجه سانتی گراد و کشت خون مثبت با استرپتوکوک ویریدانس در دو نمونه جداگانه، وجود فاکتور RF+ Conjunctival Hemorage
منبع:	جدول ۱۲۸-۳ صفحه ۱۰۲۸ دکتر حمید ابوسعیدی

عفونی	۱۲	بیمار آقای ۶۵ ساله که در روز ۲ پاکت سیگار میکشیده است با علائم سرفه و خلط تب و لرز از ۲ هفته قبل به درمانگاه مراجعه کرده است CT اسکن بیمار را ملاحظه می کنید همه درمان های زیر مناسب است <u>بجز</u> ؟
الف	آمپی سیلین-سولباکتام	
ب	کلیندامایسین	
ج	موکسی فلوکساسین	
د	مترونیدازول	*
منبع:	درمان ابسه ریه صفحه ۱۰۲۲ دکتر حمید ابوسعیدی	