

قلب	زمان سوال (ثانیه):	
۱	همه موارد زیر از اثرات دیگوکسین در درمان نارسایی قلبی می باشد به جز؟	
۱	کاهش سطح نورایی نفرین	
۲	افزایش سطح آلدوسترون	*
۳	کاهش سطح رنین	
۴	افزایش فعالیت بارورسیتور	
منبع:		
توضیح:		

قلب	زمان سوال (ثانیه):	
۲	بیمار آقای ۲۴ ساله ای می باشد که بدون سابقه بیماری خاصی به علت طپش قلب مراجعه کرده است . در بررسی های انجام شده MVP همراه با Sever MR دارد. در مورد بیمار فوق کدام اقدام صحیح می باشد؟	
۱	شروع تب بتایلاکر جهت کنترل علائم	*
۲	پرو فیلاکسی اندوکاردیت	
۳	شروع آنتی کواگولان	
۴	توصیه به تعویض دریچه میترال	
منبع:		
توضیح:		

قلب	زمان سوال (ثانیه):	
۳	بیمار خانم ۳۰ ساله ای می باشد که جهت مشاوره مراجعه کرده است و هفته ۱۲ بارداری می باشد. در کدام یک از موارد زیر توصیه به ادامه بارداری می کنید؟	
۱	تنگی شدید میترال	
۲	تنگی شدید آئورت	*
۳	کوارکتاسیون شدید	
۴	افزایش شدید فشارشریان ریوی	
منبع:		
توضیح:		


قلب	زمان سوال (ثانیه):	
۴	در بیماری که با احتمال ایسکمی میوکارد تحت تست ورزش قرار گرفته است، بروز کدام یک از موارد زیر ایسکمی میوکارد را تایید می کند؟	
۱	تاکی کارد بطنی	
۲	منفی شدن موج T	
۳	افت فشارخون	*
۴	بلوک AV درجه ۳	
منبع:		
توضیح:		


قلب	زمان سوال (ثانیه):	
۵	بیماری به علت سندرم حاد حاد کرونر تحت آنژیوگرافی و آنژیوستی قرار گرفته است بعد از دو هفته به علت تنگی نفس مراجعه کرده است که در حالت استراحت نیز وجود داردسمع قلب و ریه نرمال است. کدام یک از موارد زیر ممکن است علت آن می باشد؟	
۱	تیکا گرلر	*
۲	کلوپیدوگرل	
۳	کاپتوپریل	
۴	کارودیلول	
منبع:		
توضیح:		

قلب	زمان سوال (ثانیه):	
۶	آقای ۴۵ ساله به دنبال ابتلا به کووید در ۲ ماه گذشته به علت حملات طپش قلب پس از ایستادن مراجعه کرده است و در معاینه قلب و عروق نکته خاصی ندارد، حین دراز کشیدن $BP = 130/82$, $HR = 80$ و پس از ایستادن $BP = 130/90$, $HR = 130$ دارد. کدام درمان کمترین اثر را دارد؟	
۱	رژیم غذایی پر نمک	
۲	جوراب واریس	
۳	فلودرو کورتیزون خوراکی	
۴	بتا بلوکر	*
منبع:		
توضیح:		

قلب	زمان سوال (ثانیه):	
۷	در کدام یک از موارد زیر فشار سیتو لیک بطن راست بیشتر می باشد؟	
۱	تامپوتاد	
۲	Restrictive	*
۳	Constrictive Pericarditis	
۴	Effusive Constrictive Pericarditis	
		منبع:
		توضیح:

قلب	زمان سوال (ثانیه):	
۸	بیماری دوهفته پس از CABG با درد اترواسترنال با انتشار به قاعده گردن مراجعه کرده است. درد بیمار با تنگی نفس تشدید می شود درنوار قلب صعود قطعه ST مشاهده می شود. کدام مورد توصیه می شود؟	
۱	آسپرین	*
۲	کلشی سین	
۳	ایبوپروفن	
۴	پردنیزولون	
		منبع:
		توضیح:

قلب	زمان سوال (ثانیه): ←	
۹	- آقای ۳۵ ساله مورد اعتیاد به متادون با ۲ نوبت سنکوپ مراجعه کرده است و در CCU بستری شده است و در حین بستری تراسه زیر ثبت شده است بهترین درمان جهت وی کدام است؟ 	
*	۱	قطع متادون
	۲	تعبیه پیس میکر دائم جهت از بین بردن برادیکاردی
	۳	شروع مگزلیتین خوراکی
	۴	ارجاع جهت مطالعه الکتروفیزیولوژی
	منبع:	
	توضیح:	

قلب	زمان سوال (ثانیه):	
۱۰	آقای ۷۵ ساله مورد COPD به علت درد قفسه سینه در CCU بستری شده است و سابقه سنکوپ / پره سنکوپ ندارد و در مانیتورینگ تراسه زیر ثبت شده است. بهترین اقدام درمانی کدام است؟	
		
۱	شروع تئوفیلین خوراکی	
۲	ارجاع جهت تعبیه پیس میکر	
۳	درخواست تست ورزش جهت بررسی کرونوتروپی	
۴	اقدام خاصی لازم ندارد	*
		منبع:
		توضیح:

قلب	زمان سوال (ثانیه):	
۱۱	آقای ۶۰ ساله با دایسکشن حاد ایورت بستری شده است. در معاینه فشارخون ۱۱۰/۲۰۰ میلی متر جیوه دارد. تجویز وریدی همه داروهای زیر توصیه می شود <u>بجز</u> :	
۱	لابتالول	
۲	دیلتiazm	
۳	پروپرانولول	
۴	هیدرالازین	*
		منبع:
		توضیح:

قلب	زمان سوال (ثانیه):	
۱۲	بیمار ۵۵ ساله با درد و تندرns ناگهانی همراه با علایم ایسکمی در انگشتان پا بطور دو طرفه مراجعه کرده است. در معاینه نبض پروگزیمال و دیستال به خوبی لمس می شود. شرح حال فوق منطبق با کدام بیماری زیر است؟	
۱	ایسکمی حاد ترومبوتیک اندام	
۲	ترومبو انژییت ابلیترا	
۳	اترو امبولی	*
۴	ارتريت تاكاياسو	
منبع:		
توضیح:		

قلب	زمان سوال (ثانیه):	
۱۳	مرد ۵۵ ساله که بعلت کانسر معده بستری است بطور ناگهان دچار تنگی نفس می شود. در بررسی ها، عملکرد قلبی حفرات نرمال است. اسکن پرفیوژن ونتیلایسون ریه انجام می شود که Low probability گزارش شده است توصیه شما چیست؟	
۱	چک D dimer	
۲	سی تی انژیو ریه	*
۳	انژیوگرافی تهاجمی شریان ریه	
۴	نیاز به اقدامی ندارد و بررسی علل دیگر شود	
منبع:		
توضیح:		